

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 22-5-78434354

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Chemin d'Artigues, 33150 CENON - Tél. 86-22-75 - 86-24-35

ABONNEMENT ANNUEL

60,00 Francs

Trésor-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. | BORDEAUX 6702-46 X

16 MAI 1978 - BULLETIN TECHNIQUE N° 14

VITICULTURE

MILDIU

Malgré un faible pourcentage de germination des oeufs d'hiver, des contaminations sont susceptibles de se produire dans les prochains jours et quelques foyers primaires, d'importance réduite, pourraient apparaître localement en fin de mois.

En conséquence, il est recommandé d'effectuer un premier traitement dans les vignobles où la végétation est suffisamment développée.

BLACK-ROT

A ce jour, aucune tache n'a encore été signalée. Le traitement préconisé contre le Mildiou sera également efficace contre le Black-Rot.

OÏDIUM et ACARIENS

Se conformer aux instructions du précédent bulletin.

EUDEMIS et COCHYLIS

Le vol a débuté depuis plusieurs jours mais il est encore trop tôt pour intervenir. Attendre un prochain avis.

ARBORICULTURE

TAVELLRES DU POIRIER ET DU POMMIER

Les projections d'ascospores sont en très nette diminution. Cependant, l'accroissement important de la végétation oblige à maintenir la protection. En conséquence, il est recommandé d'effectuer un nouveau traitement dès réception du bulletin.

.../...

P 267

OIDIUM DU POMMIER

Les premières contaminations secondaires viennent d'être observées . Profiter du traitement anti-tavelure pour lutter également contre l'Oïdium en cette période particulièrement favorable au champignon.

ARAIGNEES ROUGES (P. ulmi)

Les éclosions des oeufs d'hiver sont maintenant très avancées et les populations sont très variables selon les vergers. En cas de forte infestations intervenir rapidement avec un acaricide spécifique. Si les éclosions ne sont pas terminées, choisir de préférence le tétrasul (Animert V.101).

FRAISIERS

Des pullulations de pucerons peuvent être observées dans certains champs. Dans ces situations, procéder à un traitement en tenant compte des prescriptions d'emploi pour la protection des abeilles et des délais d'application avant récolte.

GRANDES CULTURES

CEREALES D'HIVER

Nous rappelons les termes de notre précédent bulletin:

- Présence assez généralisée de ROUILLE BRUNE sur orges et blés tendres en Dordogne, Gironde et Lot et Garonne, plus sporadique dans les Landes. Cette maladie, déjà observée en fin 1977 sur repousses et dans certaines levées a été suivie depuis le 13 mars dans les 80 parcelles du réseau céréales. Les bulletins des 16 mars, 2 avril, et 25 avril tout en faisant le point sur la situation tenaient compte de sa présence dans les préconisations concernant les maladies du pied et la rhynchosporiose de l'Orge.

- Apparition de foyers de ROUILLE JAUNE affectant différentes variétés de blé (Lutin, Courtot, Capitole, Joss et Top). Dans la plupart des foyers observés et notamment dans le Lot et Garonne, les deux rouilles sont présentes. Il convient de ne pas laisser un foyer s'étendre à plus d'un mètre carré, car cette maladie peut envahir la culture de façon explosive. Nous attirons l'attention des agriculteurs sur la nécessité d'observer de près tout jaunissement des feuilles supérieures: la rouille jaune, caractérisée par des plages de pustules jaune-orangé, fines, serrées, alignées parallèlement aux nervures, peut être difficile à détecter lorsqu'elle présente des pustules jaune pâle sur des feuilles manifestant un jaunissement anormal. Se reporter au dernier bulletin pour les préconisations de produits.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
" AQUITAINE "

Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant: P. JOURNET
Inscription à la C.A.P.P.P.; n° 524 AD

M. LARGE